

## Dosis de Acetaminofén (Tylenol®)

NO se recomienda para bebés menores de 2 meses de edad.

Dar medicamento cada 4-6 horas para aliviar síntomas de fiebre o dolor.

NOTA: En algunas concentraciones (mg/mL) de acetaminofén las fases se separan. Asegúrese de verificar la concentración en el frasco de acetaminofén antes de administrarla.



Rocky Mountain  
Hospital for Children

Presbyterian/St. Luke's Medical Center  
The Medical Center of Aurora  
North Suburban Medical Center  
Rose Medical Center  
Sky Ridge Medical Center  
Swedish Medical Center



Peso (libras)	Peso (kilos)	Jarabe líquido para niños(160 mg/5 mL)	Tabletas masticables (tableta de 80 mg)
12-17 libras	5.5-7.9 kilos	2.5 mL (½ cucharita)	—
18-23 libras	8-10.9 kilos	3.7 mL (¾ cucharita)	—
24-35 libras	11-15.9 kilos	5 mL (1 cucharita)	2 tabletas (160 mg)
36-47 libras	16-20.9 kilos	7.5 mL (1 ½ cucharitas)	3 tabletas (240 mg)
48-59 libras	21-26.5 kilos	10 mL (2 cucharitas)	4 tabletas (320 mg)
60-71 libras	26.6-32.2 kilos	12.5 mL (2 ½ cucharitas)	5 tabletas (400 mg)